

Anlage 1 Bildanleitung Applikation dendritische Zelltherapie Fall 1

Applikation mit dem Luer-Lock-System

Für die Applikation der Zellen folgen Sie einfach diesen einfachen Schritten:

- Mischen Sie die Zellen durch leichtes Schwenken.
- Schrauben Sie den Verschluss ab.
- Setzen Sie die mitgelieferte Kanüle auf die Luer-Lock-Spritze.
- Applizieren Sie die Zellen wie in der Applikationsanleitung beschrieben.

Fall 1: Intradermale Applikation

Die intradermale Applikation ist die häufigste Behandlungsform. Die Applikation findet am zweckmäßigsten im Inguinalbereich Anwendung, da diese Körperstelle unbehaart ist. Es kommen aber auch andere Körperstellen nach Scheren und Desinfektion in Frage.



Die Zellsuspension kommt in einer verschlossenen Spritze.



Zellen in Suspension bringen, Kappe abdrehen und Kanüle aufsetzen.



Mehrere Quaddeln setzen.



Sie können so viele Quaddeln setzen, wie im individuellen Fall notwendig sind.

➔ **Wenn dies die einzige im Behandlungsplan beschriebene Applikationsart ist, dann werden alle Zellen in die Haut appliziert.**