

Anlage 1 Applikation autologer dendritischer Zellen beim Kleintier gemäß Verantwortungsabgrenzungsvertrag

Name Besitzer/in			
Name Patient		Diagnose	

1. Applikation mit dem Luer-Lock-System

Für die Applikation der Zellen folgen Sie diesen Schritten:

- Mischen Sie die Zellen durch leichtes Schwenken der Spritze.
- Schrauben Sie den Verschluss ab.
- Setzen Sie die mitgelieferte Kanüle auf die Luer-Lock-Spritze.
- Applizieren Sie die Zellen wie in der Applikationsanleitung beschrieben.

2. Intradermale Applikation

Die intradermale Applikation ist die häufigste Behandlungsform. Die Applikation findet am zweckmäßigsten im Inguinalbereich Anwendung, da diese Körperstelle unbehaart ist. Es kommen aber auch andere Körperstellen nach Scheren und Desinfektion in Frage.

	
1. Die Zellsuspension ist in einer verschlossenen Spritze abgefüllt.	2. Zellsuspension vorsichtig schwenken, Kappe abdrehen und Kanüle aufsetzen.
Reinigung & Desinfektion	
3. Hände und Injektionsstelle gründlich säubern und desinfizieren.	4. Die Anzahl injizierter Quaddeln kann individuell bestimmt werden.

3. Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass

- die autologe dendritische Zellsuspension wie oben beschrieben unter sterilen Kautelen intradermal injiziert wurde*, und
- ich mit der Verantwortungsabgrenzung bei der Durchführung der Immuntherapie mit autologen dendritischen Zellsuspensionen einverstanden bin.

Datum _____ Unterschrift _____

*Sollten einzelne Arbeitsschritte nicht eingehalten werden können, halten Sie bitte direkte Rücksprache mit unserem Team unter Tel. 05522-9182581.

Bitte senden Sie diese Bestätigung als Anhang per E-Mail an info@petbiocell.de

SOP TR-002/V-09	Anlage 1	Gültig ab: 30.06.2025	Seite: 1 von 1
Probenausgang			